


# クラミジア 感染症を 知っていますか？



監修  
愛知医科大学病院 感染症科  
教授 三鴨廣繁

# クラミジア感染症のこと



クラミジア感染症を知っていますか？

クラミジア・トラコマチスという微生物が感染する病気です。

性交渉のある年齢なら誰もが感染する可能性があって、特殊な病気ではありません。大切なことは、感染後できるだけ早いタイミングで、必要な検査と治療を行う事です。正しく薬を服用すれば、クラミジアをなくすことができます。

どうか怖がらずにクラミジア感染症のことを知ってください。

## 男女別の主な症状



### 男性

- 尿道からの分泌物
- 排尿時の痛み
- 尿道のかゆみ・不快感
- 陰嚢の腫れ
- 発熱 など



- ・尿道炎
- ・精巣上体炎
- ・男性不妊の原因



### 女性

- おりものの増加
- 不正出血
- 下腹部の痛み
- 性交時の痛み など



- ・子宮頸管炎
- ・子宮内膜炎
- ・卵管炎
- ・骨盤腹膜炎などに進行
- ・不妊、流産、早産の原因



クラミジア感染症は性感染症の中で  
最も多い病気です

クラミジア感染症は、性行為により感染します。性感染症では最も多い病気です。初期は自覚症状がないか、非常に軽いために知らないうちに病気が進行することがあります。また、感染に気づかず性交することで、パートナーに感染することがあります。


# 放置しないでください 早期発見・早期治療

治療しないで放置しておくと不妊症や母子感染の原因に

女性の場合は子宮頸管部への感染から卵管に感染が移ることで、不妊症に進展することがあります。妊娠時も異所性妊娠や流産・早産の危険性が高まります。出産時にクラミジアに感染していると、赤ちゃんが肺炎や結膜炎になることもあります。また、クラミジア感染を放置すると、HIV等の他の性感染症にもかかりやすくなるといわれています。クラミジア感染症は、早期発見・早期治療が大切なのです。




女性



## 女性だけの病気ではありません。男性の感染経路と注意点

男性は尿道炎を起こしやすく、症状として尿道不快感・排尿痛・かゆみ等をおこすことがあります。放置すると尿道部の感染から、精巣上体部に感染が移り炎症を起こして、男性不妊の原因になることがあります。また、クラミジアは自分とパートナーとの間で感染をくり返すピンポン感染を起こします。症状が弱いからこそ検査をしないと、パートナーにうつす可能性があります。

男 性




## パートナーも必ず検査・治療を受けましょう

男女ともに、クラミジア感染が見つかった場合にはパートナーも検査を受けることが大切です。たとえ、一方が治療をしても、パートナーが感染していれば感染を繰り返すことになりますから、無症状でもパートナーと同じタイミングで治療をする必要があります。妊娠・出産時に、大切な赤ちゃんへ感染させないためにも、しっかりと検査と治療をしましょう。

### [クラミジアの感染経路]

子宮頸管炎卵管炎



## クラミジアの検査・治療について

検査は簡単です

### 適切な検査用検体の採取部位

女性	子宮頸管部を綿棒で軽くぬぐって検査します。
男性	初尿(出始めの尿)や 尿道分泌液で検査します。
男女共	医師判断で、のどをぬぐった検体や、 うがい液で検査する場合もあります。

検査の結果はおよそ1週間程度で得られます。症状があって、  
当日に治療を開始した方が良い場合には、検査日に検査結果を得る方法があります。お腹に感染を疑う場合には、内診検査や  
血液検査を行うこともあります。



# 正しい治療と 薬で治ります



## 抗菌薬をきちんと服用して治療することが大切です

クラミジア感染症は、抗菌薬の服用で治療することができます。1回だけ服用する薬や7～14日間服用する薬があるので、クラミジアを完全になくすためには、医師や薬剤師の指示に従って、きちんと服用することが大切です。なお、妊娠中でも服用できる薬があります。心配な事があれば、医師や薬剤師に遠慮なく相談してください。

## 治療中・治療後の注意



治療中

- 医師や薬剤師の指示に従い、きちんとお薬を服用しましょう
- 治療が終了するまでは、性交は控えましょう
- パートナーも検査・治療を受けましょう
- 医師の指示通り来院しましょう

治療後

- 感染予防のために、コンドームは正しく使用しましょう
- 不特定多数のパートナーとの性交を避けましょう

病・医院名

企画・製作



住友ベークライト株式会社

提供



あすか製薬株式会社